

372 Curruca zarcera



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Macho (26-IV)

CURRUCA ZARCERA (*Sylvia communis*)

IDENTIFICACIÓN


13-15 cm. Dorso de tonos pardos y partes inferiores claras, más blancas en la garganta; coberteras del ala, terciarias y secundarias con reborde pardo-rojizo; cola parda, con las plumas externas en parte blancas; patas y pico pardo claro. **Macho nupcial** con cabeza grisácea; **macho no nupcial, hembra y juveniles** con cabeza parda. Ala 66-77 mm.

ESPECIES SIMILARES

Podría haber confusión con la **curruca tomillera**, de igual diseño alar pero de tamaño menor (12-13 cm.; ala 53-57 mm.).



Curruca tomillera. Hembra.



■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

Curruca zarcera. Extensión de la muda postjuvenil.

SEXO

En **primavera** el **macho** típico tiene la cabeza gris; pequeñas coberteras del ala con centro gris; pecho con tinte rosado; iris naranja brillante. La **hembra** tiene la cabeza sin gris; pequeñas coberteras marrones o, si acaso, gris-marrón; pecho sin rosa; iris amarillo-marrón a oliva-marrón (**CUIDADO:** hay hembras adultas que tienen gris en la cabeza y machos jóvenes que carecen de gris, existiendo además un grado de solapamiento muy grande, por lo que en esta especie se pueden sexar con seguridad sólo los casos extremos). En **otoño** sexos prácticamente similares, siendo su datación muy difícil: **macho** con gris en la base de las plumas del capirote y pequeñas coberteras; tinte rosado en el pecho; iris naranja marrón. **Hembra** sin gris en la base de las plumas del capirote y pequeñas coberteras; sin tinte rosado en el pecho; iris amarillo-marrón. Los **juveniles** y **1º año** no se pueden sexar.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo e iris grisáceo (carácter útil para datar la edad durante todo el otoño).

1º año otoño son fácilmente reconocibles si muestran contraste en las grandes coberteras (borde ocre de plumas **juveniles** más pálido que en **adultas**); si no han mudado ninguna o han cambiado todas este contraste no existe; si no han cambiado las plumas externas de la cola están salpicadas de marrón y con mal definidos bordes blancos.

2º año primavera sólo en los ejemplares que mantienen la cola juvenil, que aparece desflecada; el desgaste de las plumas del ala es mayor que en **adultos**; coberteras primarias puntiagudas y desgastadas (**CUIDADO:** los caracteres descritos no siempre son posibles de apreciar).

Adultos en **otoño** con las plumas del ala nuevas y de la misma generación (**CUIDADO:** algunos ejemplares detienen la muda de primarias y/o secundarias); iris rojizo-naranja; plumas externas de la cola con blanco puro.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

372 Curruca zarcera



MUDA


Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a finales de septiembre. **CUIDADO:** algunos ejemplares detienen la muda antes de la migración para completarla en sus áreas de invernada y presentan primarias y/o secundarias antiguas. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, algunas o todas las grandes coberteras y a veces terciarias y plumas de la cola; suele estar terminada en septiembre. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** muy extensa, entre diciembre y marzo, que puede llegar a ser completa en las aves de **2º año** y cambiar todas las plumas del ala, excepto algunas primarias, en **adultos**.

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival repartida de forma dispersa como nidificante por los sistemas montañosos de la Comunidad. Abundante en los pasos migratorios



Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Hembra (28-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Juvenil ().



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (26-IV); abajo hembra (23-IV).




Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Macho (04-IV).

372 Curruca zarcera



Curruca zarcera. Primavera. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba 2º año macho (04-IV); centro 2º año hembra (28-IV); abajo juvenil ().



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil ().



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño de la base de las plumas del capirote: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño de la base de las plumas del capirote: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil ().



Curruca zarcera. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil ().


372 *Curruca zarcera*




Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).




Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño y desgaste de la cola: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba macho (26-IV); abajo hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba 2º año macho (04-IV); centro 2º año hembra (28-IV); abajo juvenil ().



Curruca zarcera. Primavera. Diseño y desgaste de la cola: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil ().

372 Curruca zarcera




Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (26-IV); derecha hembra (23-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (04-IV); arriba derecha 2º año hembra (28-IV); izquierda juvenil ().




Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (26-IV).



Curruca zarcera. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (23-IV).

372 Curruca zarcera



Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (04-IV).




Curruca zarcera. Otoño. Adulto. Macho (31-VIII).



Curruca zarcera. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (28-IV).



Curruca zarcera. Otoño. Adulto. Hembra (31-VIII).



Curruca zarcera. Primavera. Juvenil: diseño del ala ().




Curruca zarcera. Otoño. 1º año (05-VIII).

372 *Curruca zarcera*




Curruca zarcera. Otoño. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto macho (16-IX); centro adulto hembra (31-VIII); abajo 1º año (05-VIII).

Curruca zarcera. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (31-VIII); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Diseño del capirote: arriba izquierda adulto macho (31-VIII); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Diseño de la base de las plumas del capirote: arriba adulto macho (16-IX); centro adulto hembra (31-VIII); abajo 1º año (05-VIII).

372 *Curruca zarcera*



Curruca zarcera. Otoño. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba adulto macho (16-IX); centro adulto hembra (31-VIII); abajo 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (31-VIII); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).




Curruca zarcera. Otoño. Diseño de la pluma externa de la cola: arriba izquierda adulto macho (16-IX); arriba derecha adulto hembra (31-VIII); izquierda 1º año (05-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Adulto con muda completada. Macho: diseño del ala (31-VIII).


372 *Curruca zarcera*



Curruca zarcera. Otoño. Adulto con muda suspendida. Macho: diseño del ala (31-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. Adulto con muda suspendida. Hembra: diseño del ala (31-VIII).



Curruca zarcera. Otoño. 1º año: diseño del ala (05-VIII).